IL-6

Présentation SRO avril 2024

Quentin Gégout, interne en 1er semestre, Rennes.

Aliénor Faÿsse, interne en 3ème semestre, Rennes.

ORIGINE: L'IL6, UNE MOLÉCULE UNIQUE ?

- Cytokine pro-inflammatoire pléiotropique de 212 AA.
- Rôle essentiel dans la réponse antigène spécifique et la réaction inflammatoire
- Produite par une grande variété de cellules sous l'effet du TNF α et de l'IL1
- Jusque dans les années 80: molécules distinctes : BSF2, HSF, HGF, IFN-B2
- Entité unique à partir du clonage de l'ADNc de BSF-2 (Hirano et al. 1986)

CAS CLINIQUE

- Mme R, 74 ans. ATCD: HTA, asthme, Hypothyroïdie
- Suspicion PPR atypique février 2023 par rhumatologue libéral
- Test Thérapeutique Prednisone 20 mg
- TT ostéoporotique retardé
- Bonne amélioration mais recrudescence sous 15 mg juillet 2023.

- Novembre 2023: Dorsolombalgies aiguës --> Hospit rhumatologie
- --> Cascade fracturaire T8 à L4
- --> Switch prednisone par hydrocortisone et décroissance.
- --> Tériparatide

SUITE CAS CLINIQUE:

- Réapparition douleurs rhizoméliques début février 2024
- Puis tb visuels/céphalées

Nouvelle hospitalisation:

- Diagnostic de Horton
- Bonne amélioration clinique sous CTC 1mg/kg
- EI ---> surexcitation, troubles du sommeil , fractures ostéoporotiques graves

- Alternative?

>>>TOCILIZUMAB

UNE PRODUCTION D'IL-6 EN EXCÈS

Maladie de HORTON:

- ❖ Production excessive d'IL6 (taux élevés d'IL6 R solubles circulants si la maladie est active, sévère ou en rechute).
- ❖ IL-6 sérique augmentée et corrélée à l'activité de la maladie
- ❖ Polarisation LT en Th17 et Th1 . Réponse T rég insuffisante --> Chronicisation de l'inflammation+++
- ❖ Utilisation TCZ, blocage des 2 voies de signalisation de l'IL-6 --> correction balance Th17/Treg , baisse réponse Th17 et hausse Treg.

UNE PRODUCTION D'IL-6 EN EXCÈS

Et la PPR dans tout ça?

- ❖ *Etude SEMAPHORE*
- ❖ Bénéfice TCZ dans la prise en charge des formes corticodépendantes?
- ❖ Critère de jugement: faible niveau d'activité de la maladie et la diminution significative de la dose quotidienne de corticoïdes, 24 semaines après initiation du TT.
- ❖ CJ atteint pour TCZ: 67.3 % vs 31.4 % placebo , statistiquement significatif++

Diapositive 6

Ui0

Attention Succès !

Utilisateur invité; 2024-04-03T12:28:57.981

Principales fonctions physiologiques et pathogéniques de IL-6

SIGNALISATION CLASSIQUE

Monocytes/macrophages
Hépatocytes
Certains lymphocytes T et B
Mégacaryocytes
Cellules endothéliales

Effet anti-bactérien
Cicatrisation

TRANS-SIGNALISATION

Ubiquitaire

Inflammation
Athérosclérose

Régulation de la synthèse:
2 voies distinctes

Les anti-IL6

a

QUELLES MOLÉCULES ET QUELLES INDICATIONS ?

Horton:

TCZ uniquement

- ❖ rechutes multiples ou cortico-dépendance $\geq 7,5$ mg/jour de prednisone.
- ❖ Patients nécessitant une décroissance rapide et précoce de la corticothérapie car:
-->intolérance aux corticoïdes et/ou comorbidités sévères

Polyarthrite rhumatoïde:

TCZ et Sarilumab :

- ❖ PR active, modérée à sévère après échec d'un TT conventionnel.
-> associé avec un TT DMARDs.
-> monothérapie si réponse inadéquate ou intolérance à un ou plusieurs DMARDs ou par un ou plusieurs anti-TNF.
- ❖ PR sévère, évolutive chez le patient non traité auparavant par le méthotrexate (non remboursé car SMR jugé insuffisant)

Diapositive 10

Ui0

Essayez de regarder la plénière de V devauchelle à la SFR sur les nouvelle reco dans l'acg/PPR

Utilisateur invité; 2024-04-03T12:31:39.420

QUELLES MOLÉCULES ET QUELLES INDICATIONS?

Autres indications:

TCZ uniquement:

- ❖ **Arthrite juvénile idiopathique** systémique et polyarticulaire, patients ≥ 2 ans, en 2^{ème} intention
- ❖ **Maladie de Still** chez le sujet ≥ 1 an, en 2^{ème} intention
- ❖ Infection **Covid 19 sévère** chez les adultes **recevant une CTC systémique et nécessitant une supplémentation en O2** ou une ventilation mécanique non invasive.
- ❖ **Syndrome de relargage des cytokines**, sévère ou menaçant le pronostic vital induit par une thérapie par cellules CAR-b a partir de 2 ans, (IV seulement)

Siltuximab uniquement :

- ❖ Maladie de **Castleman**

IL-6 ET PATHOLOGIE: L'EXEMPLE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

- Voie classique = rôle dans la physiologie, trans-signalisation= rôle crucial dans la maladie.
- PR ou maladie de Castleman: surproduction d'IL-6 , expliquant partiellement les symptômes inflammatoires.
- Manifestations locales et systémiques de la PR.
- Taux élevés dans le sérum et le liquide articulaire. Corrélés à l'activité de la maladie

Action de l'IL-6 dans la membrane synoviale rhumatoïde (conjointement avec TNF-alpha)

AVANT D'INTRODUIRE UN ANTI IL 6...

CI des anti IL6 :

- Infection aiguë évolutive, infections sévères.
- Hypersensibilité

Prudence... :

- Diverticulite, atteinte hépatique ou TT hépatotoxique associé, cytopénies, cancers , VVA récent.
- Grossesse : Peu de données. Nécessite une contraception efficace pendant et 3 mois après l'arrêt du TT.

Bilan Pré biothérapie:

- NFS, ASAT ALAT
- Sérologies des hépatites B, C et du VIH . IGRA
- Bilan lipidique (cholestérol, triglycérides)
- Rx thorax
- Vaccination antipneumococcique, grippe, DTP

Diapositive 14

Ui0 Est ce normal qu'il y ait plein de police différentes ?

Utilisateur invité; 2024-04-03T12:33:02.155

SUITE ET FIN CAS CLINIQUE

3 mois après l'introduction du TCZ à visée d'épargne cortisonique...

Mme R CS son med TT en fin de journée pour Douleurs abdominales aiguës épigastriques apparues la veille, d'aggravation progressive . À son arrivée au cabinet, la patiente est apyrétique.

Nauséuse, 1 épisode de vomissements le matin même.

❖ Quelles hypothèses évoquerez vous en premier lieu au vu du contexte? (2 réponses)

- A) Diverticulite
- B) Colique hépatique
- C) Pancréatite aiguë
- D) Cholecystite
- E) Ulcère gastrique

SUITE ET FIN CAS CLINIQUE

3 mois après l'introduction du TCZ à visée d'épargne cortisonique...

Mme R CS son med TT en fin de journée pour Douleurs abdominales aiguës épigastriques apparues la veille, d'aggravation progressive . À son arrivée au cabinet, la patiente est apyrétique.

Nauséuse, 1 épisode de vomissements le matin même.

❖ Quelles hypothèses évoquerez vous en premier lieu au vu du contexte? (2 réponses)

A) Diverticulite

B) Colique hépatique

C) Pancréatite aiguë

D) Cholecystite

E) Ulcère gastrique

EFFETS INDÉSIRABLES

- Augmentation du risque d'infections, respiratoires supérieures +++ . Infection sévère/opportunistes +++
- Réactivation virale (hepatite B, zona...)
- Hépatotoxicité avec cytolyse ++.
- Leucopénie/thrombopénie
- Accident cardiovasculaire (dyslipidémie, hypertriglycéridémie, HTA)
- Affections digestives (ulcérations buccales, gastriques moins fréquents , gastrites, diverticulites, diarrhées...)
- Cancer (notamment cancers cutanés non mélanomateux++ .)
- Démyélinisation du SNC
- Rashes cutanés, oedemes sous-cutanés

QUEL SUIVI?

- **Précautions particulières après introduction:**
- Surveillance du BH/NFS plaquettes (Dans les 4 à 8 semaines suivant le début du traitement, puis tous les 3 mois sauf anomalies particulières)
- EAL 3 mois après le TT puis tous les 6 mois
- Surveillance clinique soigneuse. Traquer tout signe d'infection car **fièvre et CRP masquées** .

CONCLUSION

- IL 6= Role Majeur dans la physiopathologie de la PR et Horton notamment.
- Taux corrélé à l'activité de ces 2 maladies.
- Anti Il-6 ciblant la voie classique et trans signalisation = TCZ et Sarilumab
- TCZ, une aide à venir dans les formes de PPR CTC résistantes?
- Prudence sur le plan infectieux, digestif et FR CV.
- Surveillance EAL à ne pas oublier.

Diapositive 19

FR0 Ca fait un peu trop liste.

Commencer par le cas clinique et intégrer votre physiopath progressivement pour que ce soit moins dense au départ

Puis descendez progressivement

Francois Robin; 2024-04-02T11:05:12.933

BIBLIOGRAPHIE:

- **T. Robak, A. Gladalska, H. Stepien, *et al.* Serum levels of interleukin-6 type cytokines and soluble interleukin-6 receptor in patients with rheumatoid arthritis** *Mediators Inflamm*, 7 (1998), pp. 347-353
- **R. Madhok, A. Crilly, J. Watson, *et al.* Serum interleukin 6 levels in rheumatoid arthritis: correlations with clinical and laboratory indices of disease activity** *Ann Rheum Dis*, 52 (1993), pp. 232-234
- **Giant cell arteritis: From pathogenesis to new therapeutic targets** [M. Samson](#) a b, [H. Greigert](#) a b, [T. Ghesquiere](#) a, [B. Bonnotte](#) a
- **Correlation of interleukin-6 production and disease activity in polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis** [Niall E. Roche](#) MD, [James W. Fulbright](#) MS, [Annette D. Wagner](#) MD, [Gene G. Hunder](#) MD, [Jörg J. Goronzy](#) MD, PhD, [Cornelia M. Weyand](#) MD, PhD
- **Assessment of pancreatitis associated with tocilizumab use using the United States Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System database** [Ashwin Kamath](#) 1, [Sahana D Acharya](#) 2, [Rashmi R Rao](#) 2, [Sheetal D Ullal](#) 2
- **Quelle place pour les biothérapies dans la pseudopolyarthrite rhizomélique et la maladie de Horton en 2018 ?** [A. Saraux](#), [V. Devauchelle-Pensec](#)