Pathologie étudiée	titre du protocole de Recherche	Promoteur	Phase	Description	Traitement à l'étude	Profil du patient	Stade de l'étude	Site
Rhumatisme Psoriasique	F2366 EXCEED	Novartis	III		Cosentyx SC 150 ou 300 mg vs	Patients, en échec aux AINS, naïfs de toutes biothérapies, naïfs de MTX sauf si arrêt pour inefficacité ou intolérance (Si DMARD, wash out à prévoir 4 semaines avant)	Inclusion en cours	CH de Poitiers
Rhumatisme psoriasique	I1F-MC-RHBE	LILLY	III	Etude de 24 semaines, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, suivie d'une évaluation à long terme de l'efficacité et de la sécurité d'emploi de l'ixekizumab (LY2439821) chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique actif, en échec ou intolérant à un anti-TNF	Ixekizumab	Le patient présente un diagnostic de rhumatisme psoriasique (PsA) actif depuis au moins 6 mois et répond actuellement aux critères CASPAR - avec au moins 3/68 articulations douloureuses et au moins 3/66 articulations gonflées	Suivi en cours	CHU de Nantes
Rhumatisme psoriasique	MAXIMISE	NOVARTIS	III-IV	Etude MAXIMISE (Managing Axial Manifestations in Psoritic Arthritis with Secukinumab) : étude de 52 semaines, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi du sécukinumab à une dose de 150 mg ou 300 mg par voie sous-cutanée chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique actif avec atteinte axiale ayant une réponse insuffisante aux anti-inflammatoires non stéroïdiens	Secukinumab	Adultes atteints de Rhum Pso répondant aux critères CASPAR et n'ayant jamais reçu de biothérapie. Les patients doivent présenter des signes cliniques d'atteinte rachidienne associées à une maladie active (BASDAI>=4) + EVA>=40 et une réponse insuffisante à au moins 2 AINS sur une période de 4 semaines.	Inclusion en cours	CHU de Nantes
Rhumatisme psoriasique	M16-244	ABBVIE (ex Abbott)	II	Etude de phase II, d'extension en ouvert avec le Risankizumab, multicentrique, à un seul bras chez des patients atteints de rhumatisme prosiarique actif qui ont complété l'étude précédente de phase II randomisée 1311.5.	Risankizumab	Patients adultes répondant aux critères CASPAR with peripheral symptoms at screening visit, et présentant des symptômes depuis plus de 6 mois. Have 5 or more tender joints and 5 or more swollen joints At least one PsO lesion or a documented history of PsO at	Suivi en cours	CHU de Nantes
Rhumatisme psoriasique	PROUST			Caractériser le profil des patients atteints de rhumatisme psoriasique et initiant un traitement par ustekinumab selon s'ils sont pris en charge par un dermatologue ou par un rhumatologue	ustekinumab		Inclusion en cours	CH de Morlaix