| Pathologie étudiée | titre du protocole de Recherche | Promoteur | Phase | Description | Traitement à l'étude | Profil du patient | Stade de l'étude | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gougerot Sjörgen | ETAP | PHRC Strasbourg | III | Efficacité et tolérance du Roactemra au cours du syndrome de sjogren primitif | Tocilizumab/Placebo en IV toutes les 4 sem | Score ESSDAI ≥ 5<br>anti SSA ou anti SSB positifs ou sinon, BGSA grade III ou IV, ou focus score ≥1<br>Pas de traitement antérieur par TCZ<br>Pas de corticoïdes ≥ 15 mg/jour<br>Pas de corticoïdes , AINS, chlorydrate de pilocarpine, ciméviline ou collyre de cyclosporine introduits ou à doses non stables dans les 2 semaines<br>Pas de MTX, d'anti-malariques, de léflunomide, de psychotropes introduits ou à doses non stables dans les 8 semaines<br>Pas de rituximab ou belimumab dans les 6 mois (ou toute autre | Suivi en cours | CHRU de Brest, CHU de Nantes |
| Gougerot Sjörgen | VAY736X2201 | Novartis | II | Evaluer la sécurité et l'efficacité de doses multiples de VAY736 administrées par voie sous-cutanée chez des patients | VAY736 en sc à différentes doses vs placebo | Patients âgés entre 18 et 75 ans avec un syndrome de gougerot-Sjörgen active (modérée à sévère) .<br>Glucorticoïdes < 10mg/j et stable depuis 2 semaines avant la randomisation. | Inclusion en cours | CHRU de Brest |
| Gougerot Sjörgen | ASSESS (extension) | PHRC AP-HP | Non intervention nel | Evaluations des complications systémiques et de l'évolution des patients atteints de Syndrôme de Sjogren primitif | Pas de traitement l'étude - étude de cohorte | Patient inclus dans la première phase de l'étude (ASSESS) | en attente pour prolongation de suivi ? | CHRU de Brest |