

Pathologie étudiée	titre du protocole de Recherche	Promoteur	Phase	Description	Traitement à l'étude	Profil du patient	Stade de l'étude	Site
Arthrite juvénile idiopathique	AJIBIOREM	AP-HP	III	Décroissance thérapeutique dans l'arthrite juvénile idiopathique oligoarticulaire ou polyarticulaire sans facteur rhumatoïde en maladie inactive sous biothérapie.	2 schémas de décroissances de la biothérapie	Patient âgé de 2 à 17 ans et traité par Etanercept ou Tocilizumab ou Adalimumab ou patient âgé de 6 à 17 ans et traité par Abatacept diagnostiqué d'une arthrite juvénile idiopathique persistante oligoarticulaire ou polyarticulaire avec des facteurs rhumatoïdes négatifs. Patient ayant atteint la maladie inactive dans l'année après le début de la dernière biothérapie selon les critères de Wallace et inactive depuis au moins de 6 mois. Patient avec des doses stables d'anti-inflammatoire, Methotrexate (maximum 20 mg/m2/semaine) ou autres immunosuppresseurs non biologiques pendant au moins un mois avant l'inclusion	Inclusion en cours	CHRU de Brest, CHU de Poitiers
maladie inflammatoire rhumatologiques juvénile	JIR Cohorte	Fondation rhumatisme enfants suisse	Non interventionnel	Etablissement d'une cohorte pédiatrique pour les maladies inflammatoires rhumatologiques.	Pas de traitement - étude de cohorte	Patient avec un diagnostic de maladie rhumatismale inflammatoire (AJI, connectivite, vascularite, uvéite ou fièvre périodique) dont les symptôme ont débutés avant l'âge de 18 ans révolus.	Inclusion en cours	CHRU de Brest